Diarsanyl

Pansement intestinal pour chiens, chats et poulains.



Utilisation

Pansement intestinal recommandé chez le chien et le chat en cas de diarrhées. 3 niveaux d'action :

Protection de la muqueuse digestive intestinale Apport d'electrolytes Apport energétique

Propriétés

Diarsanyl agit en couvrant la muqueuse digestive d'un film protecteur.

Chez les poulains, Diarsanyl stabilise le bilan des éléctrolytes et de l'eau en cas de troubles digestifs, pendant et après ceux-ci.

Chez les chiens et les chats, Diarsanyl réduit le risque de malabsorption intestinale aiguë et pendant la période de rétablissement qui s'ensuit.

Diarsanyl se conserve pendant 24 mois.

Composition

Montmorillonite, éléctrolytes (chlorure de sodium, sorbate de potassium, citrate de magnésium), sucres.

Mode d'emploi

Placer l'embout de la seringue dans la bouche de l'animal au niveau de la commissure des lèvres.

Enfoncer le piston de la seringue. Le cran du piston doit être à l'intérieur de la seringue.

Administrer pendant 3 jours selon les doses suivantes :

- chats et chiens de moins de 7 kg : 2 ml par jour en 2 prises.
- chiens de 7 à 18 kg : 4 ml par jour en 2 prises.
- chiens de 18 à 30 kg : 8 ml par jour en 2 prises.
- chiens de plus de 30 kg et poulains : 20 ml par jour en 2 prises.